数学Ⅱ, 数学B, 数学C

第2問 (必答問題) (配点 15)

同一平面上にある二つの円を考える。二つの円がただ一つの共有点をもつとき、二つの円は接するという。二つの円が図1のように接するとき、二つの円は外接するとい、図2のように接するとき、二つの円は内接するという。

図1 外接

図2 内接

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C第2問は次ページに続く。)

数学Ⅱ, 数学B, 数学C

実数 s は $-2 < s < 2$ を満たし, 実数 t は $t > 0$ を満たすとする。O を原点とする座標平面において, 方程式

$$x^2 + y^2 = 4$$

が表す円を C_0 , 方程式

$$x^2 - 2sx + y^2 - 2ty + s^2 = 0 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

が表す円を C とする。

- (1) C は, 中心 ($\boxed{\text{ア}}$, $\boxed{\text{イ}}$), 半径 $\boxed{\text{ウ}}$ の円である。また, C は s や t の値によらず $\boxed{\text{エ}}$ と接している。

$\boxed{\text{ア}}$ ~ $\boxed{\text{ウ}}$ の解答群 (同じものを繰り返し選んでもよい。)

① 0	② s^2	③ t^2	④ s	⑤ $2s$
⑥ $4s$	⑦ t	⑧ $2t$	⑨ $4t$	

$\boxed{\text{エ}}$ の解答群

① x 軸	② y 軸
③ 直線 $y = x$	④ 直線 $y = -x$

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C第2問は次ページに続く。)

数学Ⅱ, 数学B, 数学C

(2) C と C_0 が接する場合を考える。 C と C_0 が接したまま実数 s が $-2 < s < 2$ の範囲を動くとき、 C の中心が描く図形について考えよう。

(i) $-2 < s < 2$ に注意すると、 C_0 と C は **オ** していることがわかる。いま、 C_0 の半径を r_0 、 C の半径を r とし、 C_0 の中心と C の中心との間の距離 d を r_0 と r で表すと、 $d =$ **カ** となる。したがって、 t を s で表すと、 $t =$ **キ** となる。

オ の解答群

① 外接

② 内接

カ の解答群

① $r + r_0$

② $r - r_0$

③ $r_0 - r$

④ $r \cdot r_0$

⑤ $\frac{r}{r_0}$

⑥ $\frac{r_0}{r}$

キ の解答群

① $\frac{4 + s^2}{4}$

② $\frac{4 - s^2}{4}$

③ $\frac{\sqrt{4 + s^2}}{2}$

④ $\frac{\sqrt{4 - s^2}}{2}$

⑤ $\frac{(2 + s)^2}{4}$

⑥ $\frac{(2 - s)^2}{4}$

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C第2問は次ページに続く。)

(ii) C の中心が描く図形の概形を実線で表したものは ク である。

ク については, 最も適当なものを, 次の①~⑤のうちから一つ選べ。ただし, ①~⑤では C_0 の $y > 0$ の部分をそれぞれ破線で表している。

(数学Ⅱ, 数学B, 数学C第2問は次ページに続く。)

数学Ⅱ, 数学B, 数学C

- (3) 実数 k は $-2 < k < 2$ を満たすとする。① が表す円のうち、直線 $x = k$ と C_0 の両方に接する円は二つある。そのうち、中心が不等式 $x < k$ の表す領域にある円を C_1 、中心が不等式 $x > k$ の表す領域にある円を C_2 とする。

(1) と (2) の (ii) を考慮すると、 $k = \boxed{\text{ケ}}$ のとき C_1 の半径は最大値をとることがわかる。また、 $k = \boxed{\text{ケ}}$ のとき、 C_2 の中心の座標は

$$\left(\boxed{\text{コ}} \sqrt{\boxed{\text{サ}} - \boxed{\text{シ}}}, \boxed{\text{ス}} \sqrt{\boxed{\text{セ}} - \boxed{\text{ソ}}} \right)$$

である。