

第3問 (選択問題) (配点 20)

以下の問題を解答するにあたっては、必要に応じて29ページの正規分布表を用いててもよい。

Q 高校の校長先生は、ある日、新聞で高校生の読書に関する記事を読んだ。そこで、Q高校の生徒全員を対象に、直前の1週間の読書時間に関して、100人の生徒を無作為に抽出して調査を行った。その結果、100人の生徒のうち、この1週間に全く読書をしなかった生徒が36人であり、100人の生徒のこの1週間の読書時間(分)の平均値は204であった。Q高校の生徒全員のこの1週間の読書時間の母平均を m 、母標準偏差を150とする。

- (1) 全く読書をしなかった生徒の母比率を0.5とする。このとき、100人の無作為標本のうちで全く読書をしなかった生徒の数を表す確率変数を X とする
と、 X は ア に従う。また、 X の平均(期待値)は イウ、標準偏差は エ である。

ア については、最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ① 正規分布 $N(0, 1)$ | ② 二項分布 $B(0, 1)$ |
| ③ 正規分布 $N(100, 0.5)$ | ④ 二項分布 $B(100, 0.5)$ |
| ⑤ 正規分布 $N(100, 36)$ | ⑥ 二項分布 $B(100, 36)$ |

(数学Ⅱ・数学B第3問は次ページに続く。)

(2) 標本の大きさ 100 は十分に大きいので、100 人のうち全く読書をしなかった生徒の数は近似的に正規分布に従う。

全く読書をしなかった生徒の母比率を 0.5 とするとき、全く読書をしなかった生徒が 36 人以下となる確率を p_5 とおく。 p_5 の近似値を求めるとき、
 $p_5 = \boxed{\text{オ}}$ である。

また、全く読書をしなかった生徒の母比率を 0.4 とするとき、全く読書をしなかった生徒が 36 人以下となる確率を p_4 とおくと、 $\boxed{\text{カ}}$ である。

$\boxed{\text{オ}}$ については、最も適当なものを、次の①～⑤のうちから一つ選べ。

① 0.001

① 0.003

② 0.026

③ 0.050

④ 0.133

⑤ 0.497

$\boxed{\text{カ}}$ の解答群

① $p_4 < p_5$

① $p_4 = p_5$

② $p_4 > p_5$

(3) 1週間の読書時間の母平均 m に対する信頼度 95 % の信頼区間を $C_1 \leq m \leq C_2$ とする。標本の大きさ 100 は十分大きいことと、1週間の読書時間の標本平均が 204、母標準偏差が 150 であることを用いると、
 $C_1 + C_2 = \boxed{\text{キクケ}}$ 、 $C_2 - C_1 = \boxed{\text{コサ}} \cdot \boxed{\text{シ}}$ であることがわかる。

また、母平均 m と C_1 、 C_2 については、 $\boxed{\text{ス}}$ 。

$\boxed{\text{ス}}$ の解答群

① $C_1 \leq m \leq C_2$ が必ず成り立つ

① $m \leq C_2$ は必ず成り立つが、 $C_1 \leq m$ が成り立つとは限らない

② $C_1 \leq m$ は必ず成り立つが、 $m \leq C_2$ が成り立つとは限らない

③ $C_1 \leq m$ も $m \leq C_2$ も成り立つとは限らない

(数学Ⅱ・数学B第3問は次ページに続く。)

数学Ⅱ・数学B

(4) Q高校の図書委員長も、校長先生と同じ新聞記事を読んだため、校長先生が調査をしていることを知らずに、図書委員会として校長先生と同様の調査を独自に行つた。ただし、調査期間は校長先生による調査と同じ直前の1週間であり、対象をQ高校の生徒全員として100人の生徒を無作為に抽出した。その調査における、全く読書をしなかった生徒の数を n とする。

校長先生の調査結果によると全く読書をしなかった生徒は36人であり、

セ。

セ の解答群

- | | |
|------------------|---------------------|
| ① n は必ず36に等しい | ① n は必ず36未満である |
| ② n は必ず36より大きい | ③ n と36との大小はわからない |

(5) (4)の図書委員会が行つた調査結果による母平均 m に対する信頼度95%の信頼区間を $D_1 \leq m \leq D_2$ 、校長先生が行つた調査結果による母平均 m に対する信頼度95%の信頼区間を(3)の $C_1 \leq m \leq C_2$ とする。ただし、母集団は同一であり、1週間の読書時間の母標準偏差は150とする。

このとき、次の①～⑤のうち、正しいものはソとタである。


ソ、タ の解答群(解答の順序は問わない。)

- | |
|---|
| ① $C_1 = D_1$ と $C_2 = D_2$ が必ず成り立つ。 |
| ① $C_1 < D_2$ または $D_1 < C_2$ のどちらか一方のみが必ず成り立つ。 |
| ② $D_2 < C_1$ または $C_2 < D_1$ となる場合もある。 |
| ③ $C_2 - C_1 > D_2 - D_1$ が必ず成り立つ。 |
| ④ $C_2 - C_1 = D_2 - D_1$ が必ず成り立つ。 |
| ⑤ $C_2 - C_1 < D_2 - D_1$ が必ず成り立つ。 |

(数学Ⅱ・数学B第3問は次ページに続く。)

正規分布表

次の表は、標準正規分布の分布曲線における右図の灰色部分の面積の値をまとめたものである。



z_0	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990